

# කෙසෙල් වගාවේ වැදගත් කරුණු කිහිපයක්

දැනට දක්නට ලැබෙන කෙසෙල් වගා දර්ශ ආදිමය කැලෑ දර්ශ වන මියුසා ඇකියුමිනෝටා සහ මියුසා බැල්බිසියානා වර්ග දෙමුහුන් වී සෑදී ඇති ඒවාය. පැරණි වර්ග කරණය යටතේ **Banana** හා **Plantain** යනුවෙන් වර්ග කර තිබුණත්, වකිමානයේ සියළුම වගා දර්ශ **Banana** යටතට ගැනේ. ඇකියුමිනෝටා සහ බැල්බිසියානා වලට අදාළ ප්‍රවේණි දර්ශ පිළිවෙලින් **A** සහ **B** ලෙස හැඳුනුවෙමින් දෙමුහුන් වී දැනට දක්නට ලැබෙන වගා දර්ශ ප්‍රධාන කාණ්ඩ 3 කට ඇතුළත් කළ හැක. ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට දක්නට ලැබෙන වගා දර්ශ 29 කින් අපට වැදගත් වන ක්‍රී ඉණක, කාණ්ඩ කුනක අඩංගුකර පහත දක්වේ.

- A A A** - ආනමාළු/ඇමබොන්/රතමලා/බිං කෙසෙල්
- A A B** - පුවාලු/කෝලිකුටටු/හොඩරවාලු
- A B B** - මෝන්දම/අලු කෙසෙල්/සිනි කෙසෙල්
- B B B** - ඇටි කෙසෙල්

කෙසෙල් වල පලරු පාලනය ඉතා වැදගත්ය.

වයස මාස 4 දී පමණ සිට වූ විට වයස මාස 7 - 8 දී පිදීම සිදුවේ. අස්වනු නෙළීම වගා දර්ශ අනුව වෙනස් වේ.

ලැගරණ:- ඇඹුල් දින 96 - 98, කෝලිකුටටු දින 120 - ආනමාලු දින 80 - 90 පමණ පුවාලු දින 145 - 155

මවගස සහ පැල 2 ක් කඩා ගැනීමෙන් අස්වනු වර්ධනයේ සමතුලිතතාවයක් පවත්වා ගත හැක.

සිටුවා මාස 6 දී පමණ එක් පැලයකට පමණක් ඉඩ දෙන්න.

මවගස පිදෙන විට තව පැලයකට ඉඩ දෙන්න.

වැටී මොරෙයින්, පොළව මට්ටමෙන් කපා, ඉතිරි කොටසේ ගොබය පිහියෙන් ඉවත් කර මව ගසෙන් ඉවත් වන පරිදි අලවාගුවක් මගින් පැලය ගලවා දමන්න. (මවගසට හානියක් වීමෙන් වළකින පරිදි)