

## පඳුරු පාලනය

- මාස 4 දී එක් මොරෙයිසෙකු ද
- පිඳෙන අවස්ථාවේදී තවත් එක් මොරෙයිසෙකු ද
- අස්වනු නෙලන අවස්ථාවේදී තවත් එක් මොරෙයිසෙකු වැඩෙන්නට සලස්වන්න

## පොහොර යෙදීම

වියළි හා අතරමැදි කලාපය - ජල සම්පාදනය යටතේ

වර්ගය	යොදන කාලය	වලකට			
කාබනික පොහොර	සිටුවීමට සති දෙකකට පෙර	කිලෝ ග්‍රෑම් 10			
රසායනික පොහොර		පැළයකට/පඳුරකට ග්‍රෑම්			
		Urea	TSP	MOP	
	සිටුවීමට දින 1-2 පෙර	60	40	125	
	සිටුවා මාස 2 න්	120	80	250	
	සෑම මාස 4 කට වරක්	120	80	250	

තෙත් කලාපය

වර්ගය	යොදන කාලය	වලකට				
ඩොලමයිට්	සිටුවීමට සති දෙකකට පෙර	ග්‍රෑම් 500				
කාබනික පොහොර	සිටුවීමට සති දෙකකට පෙර	කිලෝ ග්‍රෑම් 10				
රසායනික පොහොර		පැළයකට/පඳුරකට ග්‍රෑම්				
		Urea	TSP	MOP	KE	
	සිටුවීමට දින 1-2 කට පෙර	55	50	95	-	
	සිටුවා මාස 2 න්	110	100	190	100	
	සෑම මාස 4 කට වරක්	110	100	190	100	

## කැන් ආවරණය කිරීම



- ගුණාත්මය වැඩි කිරීම සඳහා
- ඇවටි තේරී අවසන් වූ පසු මුහුණ ඉවත් කරන්න
- පොලිසැක් බැග් යොදා ආවරණය කරන්න

## අස්වනු නෙලීම

- කැන් මේරීමට ගතවන කාලය ප්‍රභේද අනුව වෙනස් වේ
- පවතින දේශගුණ තත්වය අනුවද මෙය සුළු වශයෙන් වෙනස් වේ.
- ගෙඩිවල පොත්තේ පැහැය ක්‍රමයෙන් තද කොළ සිට ලා කොළ පැහැයට හැරීම
- ගෙඩියේ දර ක්‍රමයෙන් අඬුවීම
- ගෙඩිවලට තට්ටුකර බැලූ විට ඇති වන ශබ්දයේ වෙනස

වැඩි විස්තර සඳහා  
 ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම ජාලයේ නායක හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය,  
 මාකදුර, ගෝනවිල (වයඹ)  
 දුරකථන: 031-2299625  
 විද්‍යුත් තැපෑල: ardcmk@yahoo.com

නාෂ්ණික තොරතුරු සැපයීම  
 එච්.එම්. සරත්විමල (කෘෂිකර්ම උපදේශක)

# කෙසෙල් විගාව



කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශනයකි - 2014

## හැඳින්වීම

විවිධ දේශගුණික තත්ත්ව යටතේ වගාකල හැකි වසර පුරාම අස්වනු ලැබෙන ආර්ථිකව ලාභදායී වගාවක් වන බැවින් මෙම පලතුර ලංකාව පුරාම ව්‍යාප්තව ඇත.

## ප්‍රයෝජන

- පලතුරක් හා ව්‍යංජනයක් ලෙස
- රසකැවිලි, පලතුරු බීම, ළදරු ආහාර වර්ග, ආයුර්වේද ඖෂධ හා මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනයේදී

## දේශගුණික අවශ්‍යතා

- උච්චත්වය - මුහුදු මට්ටමේ සිට 1500m
- වර්ෂාපතනය - වසර පුරා ඇතිරුණු 1250-1900mm
- උෂ්ණත්වය - 25-30°C වඩා සුදුසුය

## පිස

- ලෝම පස (හොඳ ජලවහනයක් සහිත ජලය රඳවා ගැනීමේ හැකියාව සතුටුදායක)
- පාංශු ගැඹුර 1.5m පමණ වීම
- පී.වී. අගය 7 ට ආසන්න වීම

## කෙසෙල් වගා රටා

### 1. තනි වගාවක් ලෙස


වර්ගය	පරතරය (අඩි)	පැළ අවශ්‍යතාවය (අක්කර 1 ක් සඳහා)
කෝලිකුට්ටු බිං කෙසෙල්	8x8	675
ආනමාලු ඇමිබන්	12x12	300
අනෙකුත් වර්ග	10x10	435

### 2. අනුභව බෝගයක් ලෙස (පොල් වගාව තුළ)

- පොල් පැළ සිටුවා මුල් වසර 05 තුළ හා වසර 25 ට වැඩි පොල් වගාවන් තුළ නිර්දේශ කෙරේ.
- පොල් පැළ අතර පරතරය - 8m x 8m


## සිටුවන ක්‍රම

### 1. එකේ එකේ පේලි ක්‍රමය




ඡන්තරය - 4m x 4m  
අක්කරයකට අවශ්‍ය පැළ - 150-175

### 2. දෙකේ දෙකේ පේලි ක්‍රමය



ඡන්තරය - 2.7m x 2.7m  
අක්කරයකට අවශ්‍ය පැළ - 400-425

### 3. දෙකේ තුනේ පේලි ක්‍රමය



ඡන්තරය - 2.7m x 2m  
අක්කරයකට අවශ්‍ය පැළ - 550-575

## වගාවට සුදුසු ප්‍රභේද

	පලතුරු ලෙස	ව්‍යංජන ලෙස
වියළි කලාපය	කෝලිකුට්ටු, ඇඹුල්, සිනි කෙසෙල්, කණ්ඩුල	දිය මොන්දන්, පුලුහිසි, ඇටමුරු, අළුමොන්දන්, අළුකෙසෙල්, ප්‍රසාද්, කණ්ඩුල
අතරමැදි කලාපය	කෝලිකුට්ටු, ඇඹුල්, ආනමාලු, ඇමිබන්, සිනි කෙසෙල්, කණ්ඩුල	දිය මොන්දන්, ප්‍රසාද්, අළුමොන්දන්, කණ්ඩුල, කිතල, අළුකෙසෙල්, පුලුහිසි
තෙත් කලාපය	ඇඹුල්, ආනමාලු, ඇමිබන්, සිනි කෙසෙල්, රත්කෙසෙල්, පුටාලු බිං කෙසෙල්, කණ්ඩුල	දිය මොන්දන්, පුලුහිසි, ඇටමුරු, අළුමොන්දන්, කිතල, අළුකෙසෙල්, ප්‍රසාද්

## පැළ සිටුවීම

වලක ප්‍රමාණය - අඩි 2x2x2

## රෝපණ ද්‍රව්‍ය

1. මොරෙයින
2. පටක රෝපණ පැළ
3. අල කැබලි මගින් සාදාගන්නා පැළ

මොරෙයින වර්ග 3 කි



කැබලි මගින් සාදාගන්නා කැබලි මගින් සාදාගන්නා කැබලි මගින් සාදාගන්නා

කැබලි මගින් සාදාගන්නා කැබලි මගින් සාදාගන්නා කැබලි මගින් සාදාගන්නා

කැබලි මගින් සාදාගන්නා කැබලි මගින් සාදාගන්නා කැබලි මගින් සාදාගන්නා

## මොරෙයින තේරීම හා සැකසීම

- නිරෝගි වගාවකින් පැළ ලබාගන්න
- උස 75 cm හා කෝමයේ විෂ්කම්භය 15-20 cm පමණ පැළ තෝරා ගන්න
- දිරු හා හානි වූ කොටස් ඉවත් වන ලෙස කෝමය හොඳින් පිරිසිදු කරන්න

## මොරෙයින සඳහා පූර්ව ප්‍රතිකාර

### 1. උණු ජල ප්‍රතිකාර ක්‍රමය

100°C උෂ්ණත්වයට රත්කර ගත් ජලයේ තත්පර 30 ක කාලයක් පැළයේ කෝමය කොටස ගිල්වා ගන්න.

### 2 ක්‍රමය

- අමු ගොම හා අළු ජලයේ මිශ්‍රකර උකු ද්‍රවණයක් සකසා ගන්න
- ද්‍රවණයේ විනාඩි 5-10 ක් පැළයේ කෝමය කොටස ගිල්වා ගන්න
- සෞඛ්‍ය සහිත ස්ථානයක සති 1 ක් පමණ තබා සිටුවීමට ගන්න