

A VACCINE FOR IMMUNISATION OF CATTLE AND BUFFALOES AGAINST HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA

M C L de Alwis


To protect cattle and buffaloes from Haemorrhagic Septicaemia disease, oil adjuvant, as well as Alum precipitated vaccines, were used in the past. Experiments in other countries have shown that the oil adjuvant vaccine gives protection to cattle and buffaloes for 11-18 months while Alum precipitated vaccine was effective only for 4-6 months.

Production of oil adjuvant vaccine in Sri Lanka was discontinued 10 years ago, due to difficulty of obtaining the particular type of oil. Thereafter only the Alum precipitated vaccine was produced. Recently numerous instances had been recorded, where this vaccine failed to adequately immunise buffaloes. In some places disease outbreak occurred as early as 6 weeks to 3 months after vaccination.

Now, (using Lanka white oil BP-P 524) an oil adjuvant vaccine is being produced locally. Vaccinate 4-5 month old calves and thereafter annually, to immunise them against H.S. disease.

The oil adjuvant vaccine is a thick emulsion. It is difficult to administer, unlike the alum vaccine. Therefore use a gauge 14 or 15 needle in a nylon syringe, for administration of the oil adjuvant vaccine. The vaccine (like other vaccines) must be stored in a refrigerator, but it must be placed at room temperature for at least 12 hours before use.

The H.S. oil adjuvant vaccine for immunisation of cattle and buffaloes is now available for use at the Veterinary Vaccine Production Centre, Peradeniya.



රත්නාශ්‍රව රෝගය වලක්වන නව

එන්නත් සාරයක්

එල හරකුක් සහ මී ගවයන්, රත්නාශ්‍රව රෝගයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට තෙල් හා සංයුක්ත එන්නත් සාරයක් සහ ඇලම් ආශ්‍රිත - එන්නත් සාර භාවිතා කරන ලදී. තෙල් හා සංයුක්ත එන්නත් සාර භාවිතයෙන්, මාස 11 සිට 18 දක්වා කාලයක්, ගවයන් ආරක්ෂා කර ගත හැක. අනෙක් එන්නත් සාර වර්ගය භාවිතයෙන් සති 6 සිට මාස 3 අතර කාලයේ දී පවා, එන්නත් කළ ගවයන්ට රෝගය වැලඳෙන බව පෙනී ගියේ ය.

ලංකා බහිර තෙල් වර්ධලය අලෙවිකරන ඩී.පී.-පී.524 තෙල් වර්ගය උපයෝගී කරගෙන පේරාදෙණියේ, එන්නත් සාර නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයේ නිපදවන ලද තෙල් හා සංයුක්ත එන්නත් සාරය මාස 10 කට අධික කාලයක්, රෝගය සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණය ලබාදෙන බව පෙනී ගොස් ඇත.

මාස 4 සිට 5 දක්වා වයසැති වසු පැටවුන් පළමුවරට එන්නත් කර, ඉන්පසු අවුරුද්දකට වරක් එන්නත් කිරීමෙන්, එම සතුන් රත්නාශ්‍රව රෝගයෙන් බේරා ගත හැක.

මෙම එන්නත් සාරය ශීත කරණයක ගබඩා කළ යුතුය. එන්නත් කිරීමට පෙර අඩු වශයෙන් පැය 12 කට පෙර ශීත කරණයෙන් ඉවත්කර කාමරයේ ඇති උෂ්ණත්වය යටතේ තබාගැනීමටත්, එන්නත් කිරීමට ගේජ් 14 හෝ 15 කටුවක් යෙදූ තරිලොක් සිරිපයක් භාවිතා කිරීමත් අවශ්‍යයි. හේතුව මෙම එන්නත් සාරය උතු තෙලෝදයක් වීමය.

මෙම එන්නත් සාරය පේරාදෙණියේ පශු එන්නත් සාර නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයෙන් ලබාගත හැක.