



ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන වැඩසටහන

යල කන්නය 2020

කෝයා වගාව

- විශලී කාලයේ දී අස්වනු නෙලීමට හැකිවන පරිදි බෝගය වගා කරන්න.
- අධික වර්ෂාව මෙන්ම අධික විශලී දේශගුණය බීජ පැළවීම දුර්වල කරයි.
- අක්කර 01 ක් සඳහා බීජ කිලෝ ග්‍රෑම් 20 - 22
- මාස 2 1/2 - 3 අතරදී අස්වනු නෙළාගත හැක.
- අක්කරයකින් කිලෝ ග්‍රෑම් 800-1200 ක් ලබාගත හැක.
- නිර්දේශිත ප්‍රභේදය - පී.බී. 01

**බීජ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමට පෙර පුරෝහණය පරීක්ෂා කර බලන්න.
එහි ගැටළුවක් පවතී නම් බීජ ලබාගත් ස්ථානයට
නොපමාව වාරතා කරන්න.**

- වගාව පිහිටුවීම සඳහා ගැඹුරට පස පෙරලා කැටි පොඬිකර, ඇලි වැටී හෝ උස් පාත්ති සකස් කර ගන්න.

බීජ සිටුවීමට පෙර ජලය සම්පාදනය කර අමතර ජලය බැස ගිය පසු බීජ සිටුවන්න.

- බීජ සිටුවීමේ දී බැක්ටීරියා මඟින් ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් අස්වැන්න වැඩිවීම සහ යුරියා පොහොර යෙදීම අඩු කර ගත හැකි බැවින්, මේ සඳහා කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතාගෙන් තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා ගන්න.
- පසට කාබනික පොහොර යොදන්න.
- පාංශු පරීක්ෂාවකින් අනතුරුව අවශ්‍ය මූලික රසායනික පොහොර යෙදීම සිදු කිරීමට කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතාගේ උපදෙස් ලබාගන්න.
- ජේලි අතර පරතරය සෙ.මී. 40ක් ද පැළ අතර සෙ.මී. 10ක් ද වන ලෙස පාත්තියක බෝග ජේලි 2-3 ලෙස හෝ කුඹුරු ඉඩම්වල ඇලි වැටී ලෙස සිටුවිය හැක.

- ඇඟිලි පුරකක් පමණ ගැඹුරට හිලක් සාදා බීජ 02 බැඟින් සිටුවන්න.
- එක ස්ථානයකට බීජ දෙකක් දමා සෙ.මී. 3 ක් පමණ යටකර පැළවීමෙන් සති දෙකකින් එකක් ඉවත් කිරීම කළ යුතුය.
- පළමු මාසය තුළ දින 4 කට වරක්ද, ඉන් පසුව දින 7 කට වරක්ද ජලය සැපයීම ජලය වැඩිවීම නිසා දිලීර රෝග ඇතිවිය හැකි බැවින් පසේ තෙතමනය ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය.

මල් හට ගන්න අවස්ථාවේදී අක්කරයකට කිලෝ ග්‍රෑම් 40 ක් වන ලෙස යුරියා යොදන්න.

(හොඳින් මුල ගැටිති වර්ධනය වී තිබේ නම් කිලෝ ග්‍රෑම් 25 ක් කෘෂිකර්ම උපදේශකවරයාගේ උපදෙස් මත)

- හොඳින් ශාකය වර්ධනය වන තුරු දෙවරක් වල් පැළ පාලනය කරන්න. (පැළ තුනී කිරීමේ දී සහ මතුපිට පොහොර යෙදීමේ දී)

රෝග සහ පලිබෝධ හානි පාලනය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපදෙස් කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතාගෙන් ලබා ගන්න.

- කරල් මෝරන විට කළු පැහැයට හැරේ. වගාවෙන් 95% පමණ දුඹුරු පාටට හැරෙන විට ගස් සියල්ල එකවර කපා ගන්න.
- හොඳින් වියළා ගත් ශාක ගෝනියක දමා ලියකින් ගසා හෝ යාන්ත්‍රිකව බීජ වෙන්කර ගන්න.
- වියළා ගත් බීජ පැය කිහිපයක් මද පවනේ තබා පිරිසුදු ගෝනිවල අසුරා වියළී සිසිල් ස්ථානයක අසුරන්න.

වෙන් කරගත් බීජ හොඳින් වියලීම සිදුකරන්න

(වියළීම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා උළු ඇටයක් සපා බැලූ විට “ටකස්” ගබ්දයෙන් දෙකඩ වී යා යුතුය)

- ගබඩා පළිබෝධ හානි අවම කර ගැනීම සඳහා ඇසිරීමේ දී වියළී කොහොඹ කොළ හෝ දෙහි කොළ යෙදීම සුදුසුයි.

ඔබගේ, ලබන කන්නයේ වගාවට අවශ්‍ය බීජ වෙනුවෙන් මෙම අස්වැන්නෙන් කොටසක් ආරක්ෂාකාරීව තබා ගන්න.

"කොභෝනා උරුමය - ආහාර ආරක්ෂාව සඳහා"

කෝයා වගාව පිළිබඳව ඔබට ඇතිවන ගැටළු විසඳා ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ 1920 කෘෂි උපදේශන සේවාවෙන් විමසන්න

කෘෂිකර්ම උපදේශක/තාක්ෂණ සහයක/මහවැලි ක්ෂේත්‍ර සහකාර

දුරකතන අංකය