

**පහත රට තෙත් කලාපයේ යකඩ විෂ සහිත බනිප් පස්වල
වගාකරන ගොයම් වලට වැළඳෙන දුඹුරුවීම සඳහා සමහර
පාංශු සමග (Amendments) වල සඵලතාවය**

ඩබ්.එම්.ජේ.බණ්ඩාර සහ ජී.ඒ. ගුණතිලක

ප්‍රාදේශය කෘෂිකම් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය

බෝඹුවල

නිවර්තන හා උපනිවර්තන රටවල මඩකුඹුරුවල වගා කරන ගොයම්වල පත්‍ර දුඹුරුවීමට හේතුවන යකඩ විෂවීම කායික විෂමතාවයකි (Ottow *et al.*, 1983). ශ්‍රී ලංකාවේ පහත රට තෙත් කලාපයේ වී වගාවට පසෙන් බලපාන ප්‍රධාන බාධකය මෙය වේ. පහත රට තෙත් කලාපයේ (LCWZ) වී වගා කරනු ලබන හෙක්ටයාර්, 90,000 කින් ආසන්න වශයෙන් 1/3 පමණ යකඩ විෂවීම තත්වයේ විභවයක් ඇතැයි සැලකිල්ලට ගත හැක (Gunatilake, 1989). කෙසේ වෙතත් මෙය දක්නට ලැබෙන්නේ යාබද වූ විශාල බිම් ප්‍රදේශවල නොව කඩිත් කඩ පැල්ලම් වශයෙනි.

මෙම ප්‍රශ්ණයන් සමග කිට්ටු සම්බන්ධයක් දක්නට ලැබෙන්නේ දියවිය හැකි අතිරේක යකඩ, අඩු පී.එච් අගය දුර්ලභ ජලවහනය (පස් ඔක්සිහරණ තත්වය) පොස්පරස් හා පොටෑසියම් වල අඩු ප්‍රමාණයන්, හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් වැනි ශ්වසන නිෂේධක ආදීන්ය (Ponnamperuma, 1958; Breeman and Moorman, 1978; Ottow *et al.*, 1983).

ඉහත සඳහන් සාධක වල සම්මිශ්‍රණයන් නිසා පහත රට තෙත් කලාපයේ සාමාන්‍යයෙන් මෙය ඇති වන්නේ පලවෙති හා දෙවෙති කාන්ඩයේ මිටියාවත්වලය. මෙම මිටියාවත් වල වැලි පයෙහි ඇති අඩු සිලිකා, පොස්පරස් හා පොටෑසියම් සාන්ද්‍රණව නිසා පැලෑටි දුඹුරුවීමට නැඹුරුතාවයක් දක්වයි. මේ හේතුව නිසා ආම්ලික තත්වයන් යටතේ අධික ප්‍රමාණයන්ගෙන් ක්‍රියාකාරී යකඩ තිබීමට වඩා, යකඩ විෂවීම බහුච්ඡ පෝෂණයට සම්බන්ධ පාංශු ප්‍රත්‍යාබලයක් ලෙස සැලකිය හැක (Benckiser *et al.*, 1982; Ottow *et al.*, 1983). පත්‍ර රතුවත් දුඹුරු වණයකට හැරීම (Ota & Yamada, 1962) පදුරු දැමීම ඇතහිටීම, මුල්වල වධිතය ඇතහිටීම, රළු බව, පාට වෙනස්වීම හා මියයෑම (Ponnamperuma, 1958; Van Breeman & Moorman, 1978) මෙම විෂමතාවයෙහි ගති ගුණාත්මක ලක්ෂණයි.

යකඩ විෂවීම හටගැනීම සඳහා පටක වල තිබිය යුතු යකඩ සාන්ද්‍රණය පහත සඳහන් කරුණු අනුව වෙනස් වේ. ඒවා පිළිවෙලින් ප්‍රභේදය, වැඩිමේ අවස්ථාව

සහ පෝෂක තත්වයයි (Tanaka and Navasero 1966; Jayawardena *et al.*, 1977). මෙම ගැටලුවට මුහුණදීමට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඇති ප්‍රභේද භාවිතා කලත්, මෙය සාර්ථක වන්නේ මධ්‍යස්ථ විෂ සහිත අවස්ථාවලදී පමණය.

පසට හුණු යෙදීම (Ponnamperuma, 1958) කාලීනව මතුපිට ජලවහනය, අභ්‍යන්තර ජල ප්‍රවාහය රදවා තැබීම, සාර්ථක පොහොර පාලනය (Van Breeman and Moorman, 1978; Bandara and Gunatilake, 1994) සහ පිදුරු යෙදීම (Li Jin pie, 1984) ආදිය මෙම කායික විෂමතාවය මැඩ පැවැත්වීමේ සඵල කායනීයන් වේ. වාර්ගික ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව සහ පොහොර පාලනය එකතුවක් මෙය වධිතය සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය සහ ආර්ථික වශයෙන් ලාභදායක වේ.

මෙම වාර්තාවෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ යකඩ විෂවීම විභවයක් ඇති බහිෂ් පස්වල කරන ලද පර්යේෂණ වල ප්‍රතිඵලය. මෙම පර්යේෂණ වලින් බලාපොරොත්තු වූයේ ඔරොත්තු දෙන හා රෝග පාත්‍රීවන වර්ග භාවිතා කර යකඩ විෂවීම ඉවත් කිරීමට සමහර පාංශු සමන භාවිතයේ සඵලකාවය. සොයා ගැනීමය.

ද්‍රව්‍ය හා ක්‍රමය

ශ්‍රී ලංකාවේ පහතරට තෙත් කලාපයට අයත්වන කර්තර දිස්ත්‍රික්කයේ බෝඹුවල මිරිස් පැල වත්ත හා ගල්ලස්ස නාගොඩ යන ස්ථානවල යකඩ විෂ සහිත බහිෂ් පස්වල වගාකරන ලද ගොයම් වල

දුඹුරුවීම වැලැක්වීම සඳහා විවිධ පාංශු සමන සමග ප්‍රතික්‍රියාව සැසදීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණ පවත්වන ලදී. මෙම පරීක්ෂණවලදී විවලාස සාධක ලෙස ගන්නා ගෙන ඇත්තේ වී ප්‍රභේදය සහ පාංශු සමනයයි. මෙම අධ්‍යයනයේදී භාවිතා කරන ලද්දේ බීජ 94-1 (ග්‍රාහී ප්‍රභේදය) සහ බී වබ්ලිව් 267-3 (ධාරණ ප්‍රභේදය)

භාවිතා කරන ලද පාංශු සමන පහත සඳහන් වේ.

- (අ) පොහොර ප්‍රමාණය 1
හෙක්/හ කි.ග්‍රෑම් 72.0 +
හෙක්ට/P₂O₅ කි.ග්‍රෑම් 49.0 +
හෙක්/K₂O කි.ග්‍රෑම් 69.0
- (ආ) පොහොර ප්‍රමාණය 2
(හෙක්/හ කි.ග්‍රෑම් 72.0 +
හෙක්./P₂O₅ කි.ග්‍රෑම් 73.5 +
හෙක්/K₂O කි.ග්‍රෑම් 103.5
- (ඇ) ගොයම් පිදුරු හෙක්/ටොන් 4 + පොහොර ප්‍රමාණය 1
- (ඈ) හුණු හෙක්/ටොන් 7 + පොහොර ප්‍රමාණය 1
- (ඊ) දහසියා අළු හෙක්/ටොන් 0.8+ පොහොර ප්‍රමාණය 1

මෙම කර්තෘත් විසින් පහතරට තෙත් කලාපයේ යකඩ විෂ සහිත බහිෂ් පස්වල වගාකරන වී වල දුඹුරුවීම වැලැක්වීම සඳහා, යොදන P සහ K මට්ටම් වල බලපෑම සොයා බැලීම සඳහා පවත්වන ලද පර්යේෂණ මාලාවක ප්‍රතිඵල අනුව පොහොර ප්‍රමාණය 2 හි සඳහන්

හෙක්ටයාරයකට P₂O₅ කිලෝ ග්‍රෑම් 73.5 හා හෙක්ටයාරයකට K₂O කිලෝ ග්‍රෑම් 103.5 ප්‍රමාණයන් තෝරා ගන්නා ලදී. (Bandara and Gunatilake, 1994) 1958 දී පොත්තම්පෙරුම විසින් යකඩ විෂ පස්වලට නිර්දේශ කරන ලද හුණු ප්‍රමාණය මෙම පරීක්ෂණය සඳහා ද තෝරා ගන්නා ලදී.

ගොයම් ඊදුරු හා හුණු පැලපිටුවීමට සති 2 පෙර යොදන ලද අතර දහයියා අළු පැල පිටුවන අවස්ථාවේදී යොදන ලදී. වී පොතු (දහයියා) ක්‍රමය ජීවින් විසින් විශෝජනය කිරීම සමත් සිදුවන නිසා බෝගයේ වඩන අවධියේදී ඒවායේ අඩංගු දේ පසට නිකුත් කිරීමේ පහසුව සඳහා දහයියා පුළුස්සා, අළු යොදන ලදී. මෙම පිලිස්සීමේ ක්‍රියාවලියේදී දහයියා ටොන් 4 කින් ලබාගත හැක්කේ දහයියා අළු ටොන් 0.8කි. ප්‍රතිකාර කෙටරක් ප්‍රතිගුණනය කර සසම්භාවී සම්පූර්ණ කොටු සැලසුම් ක්‍රමය අනුව පර්යේෂණය පවත්වන ලදී.

නයිට්‍රජන් හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 72.0 කොටස් තුනකට බෙදා හෙක්ටයාරයකට කිලෝ ග්‍රෑම් 15.4 ක් මූලික පොහොර ලෙසද පැල පිටුවා සති 3 සහ 6 පසුව හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 28.3 බැගින් ද යොදන ලදී. පොස්පේට් පොහොර සාන්ද්‍ර සුපර් පොස්පේට් ලෙස පැල පිටුවීමට පෙරද පොටෑසියම් පොහොර මිසුරියේට් ඔස් පොටෑෂ් ලෙස සමාන කොටස් තුනකට බෙදා පැල පිටුවන විට

හා පැල පිටුවා සති 3, 6 පසුව යොදන ලදී. ප්‍රභේද දෙකේම සති තුනක් වයස් ගතවූ බීජ පැල සෙ.මී.20 x 15 පරතරයකට එක තැනක පැල 3 බැගින් පිටුවන ලදී. වල් මධ්‍යය අතින් කල අතර එය සෑම පොහොර යෙදීමක් සමගම කරන ලදී.

කෘමි පලිබෝධකයින්ගෙන් පැලෑටි ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී නිර්දේශිත මාත්‍රා වලට කෘමිනාශක යොදන ලදී.

IRRI සම්මත අගැටීමේ ක්‍රමය අනුව දුඹුරුවීමේ ලක්ෂණ වල උග්‍රතාවය ආවර්තව සටහන් කර ගන්නා ලදී. (අනුබද්ධය 1) සෑම ප්‍රතිකාරයකම ධාන්‍ය අස්වැන්න සටහන් කර ගන්නා ලදී. මෙම පරීක්ෂණය කන්න දෙකක්, එනම් 1986/87 මහ කන්නයේදී මිරිස් පැල වත්ක-බෝඹුවල ද, 1987/88 මහ කන්නයේදී ගල්ලස්ස නාගොඩ හිදී පවත්වන ලදී.

පර්යේෂණ පවත්වනලද ක්‍ෂේත්‍රයේ සාරවත්භාවය ගැන සොයාබැලීම සඳහා පර්යේෂණය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම පස විශ්ලේෂණය කරන ලදී. පසේ ඇති Fe හ K අන්තර්ගතය නිස්සාරණය කිරීම සඳහා පි.එච් අගය 4.8 ක් වූ 1N ඇමෝනියම් ඇසිටේට් භාවිතා කරන ලදී. මෙම නිස්සාරිතය පරමානු අවශෝෂණ වර්ණවලී දීප්තිමාණ ආධාරයෙන් මිණුම් ගන්නා ලදී. පැලෑටි සාම්පල සල්පියුරික් අම්ලය හා පර්ක්ලෝරික් අම්ල වල මිශ්‍රණයක්

ආධාරයෙන් ජීරණය කරන ලදී. එම නිස්සාරිකයේ අඩංගු Fe ප්‍රමාණය පරමාණු අවශෝෂණ වර්ණවලී දීප්තිමාණ ආධාරයන්සොයා ගන්නා ලදී (PCARR , 1980).

ප්‍රතිඵල හා සාකච්ඡාව

~~පලවේගී වගුවේ පෙන්නුම් කරන~~ පාංශු විශ්ලේෂණ දත්තයන් අනුව මෙම පරීක්ෂණය පවත්වන ලද ක්ෂේත්‍රයේ පස්වල වයනය ලෝම වැලිය. කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය 3.0 සහ 5.8% කි. පාංශු ප්‍රතික්‍රියාව ආම්ලික වන අතර අඩු පොස්පරස් හා පොටෑසියම් ප්‍රමාණයක් ඇත. මෙම පස්වල ඇමෝනියම් ඇසිටේට් මගින් නිස්සාරණය කල හැකි යකඩ තුලනාත්මකව වැඩිය.

පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව ධාරණ ප්‍රභේදයන් (මරොක්කු දෙන) භාවිතයෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි බව පෙන්වයි (වගුව 2). මෙම පරීක්ෂණයේදී භාවිතාකරන ලද සමන මගින් දුඹුරුවීමේ ලක්ෂණ උනන්දු වීම ද, පටකවල යකඩ ප්‍රමාණය අඩුවීමද, පැලෑටිවල වැඩිම දියුණු කිරීම ද, ප්‍රභේද දෙකේම ධාන්‍ය අස්වැන්න පාලක ප්‍රතිකාරය සමග සැසදීමේදී වැඩිවීමක්ද පෙන්නුම් කරයි (වගුව 2).

ග්‍රාහි ප්‍රභේදයේ (බීජ 94-1) මෙම සඵලතාවය වඩාත් පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන ලදී. මෙහි පටක වල අධික යකඩ ප්‍රමාණයන් තිබුණි. ප්‍රභේද දෙකේම වැඩිම අස්වැන්නක් වාර්තාවූයේ වැඩි ප්‍රමාණයන්ගෙන් P හා K පොහොර යෙදීම (පොහොර ප්‍රමාණය 2) සහ පිදුරු ~~සහ පොහොර ප්‍රමාණය 2~~ හෝ හුණු හේතුව යකඩ විෂ සහිත පස්වල පෝෂක උණකා සහ/හැකහොත් අසමතාවය, පිදුරු සහ අමතර පොහොර මාත්‍රාවක් යෙදීමෙන් හිවැරදි කිරීම නිසා විය යුතුය.

දහයියා අළු යෙදීමෙන් ධාන්‍ය අස්වැන්නේ වැඩිවීමක් ඇති නමුත් එය පිදුරු සහ පොහොර ප්‍රමාණ 2 හෝ හුණු යෙදීමෙන් වාර්තා වූ අස්වැන්න මට්ටමට වඩා අඩුය.

මෙම පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල වලින් පෙන්නුම් කරනුයේ වී ධාන්‍ය අස්වැන්න වැඩිකර ගැනීමට, යකඩ විෂ සහිත පස්වලට, වැඩි ප්‍රමාණයන්ගෙන් P සහ K (පොහොර ප්‍රමාණය 2) හෝ පිදුරු යෙදීම වාසි දායක බවය. වැඩි ප්‍රමාණයන්ගෙන් P සහ K පොහොර පහතරට තෙත් කලාපයේ යකඩ විෂ සහිත බනිප් පස්වලට යෙදීමෙන් ප්‍රභේද දෙකේම අස්වැන්න වැඩිවීමක් පෙන්නුම්කල බව මීට ඉහත දී ද Bandara and Gunatilake (1994) විසින් වාර්තා කර ඇත.

වගුව 1 පර්යේෂණ පවත්වන ලද කොත්‍රයේ පස්වල සමහර භෞතික - රසායනික ගතිගුණ

ගතිගුණ	1 ස්ථානය (මිරිස් පැල වත්ත- බෝවුමල)	2 ස්ථානය ගල්ලස්ස-නාගොඩ
මැටි %	14.2	12.5
රොන්මඩ%	8.1	9.3
වැලි %	77.7	78.2
කාබනික ද්‍රව්‍ය %	5.8	3.0
පී.එච්(H ₂ O) 1:1	5.0	5.1
සම්පූර්ණ N %	0.198	0.130
උපයෝග්‍ය P (ppm) (Olsen)	2.8	3.2
හුවමාරු කර ගත හැකි K (meq/100 g පස්)	0.08	0.08
නිස්සාරණය කල හැකි Fe (ppm)	865	1322

වගුව 2 යකඩ විෂ සහිත බනිප් පස්වල වගාකරන ලද වී වල දුඹුරුවීම, පටකවල Fe සාන්ද්‍රණය හා ධාන්‍ය අස්වැන්න කෙරෙහි පාංශු සමන දක්වන බලපෑම

ප්‍රභේදය	සමන වර්ග	මහ 1986/87 (මිරිස්පැලවත්ත)		මහ 1987/88 (ගල්ලස්ස)			
		පටකවල Fe (ppm)	ධාන්‍ය අස්වැන්න (හෙක්/වොන්)	පටකවල Fe (ppm)	ධාන්‍ය අස්වැන්න (හෙක්/වොන්)		
බීජ 94-1 පොහොර ප්‍රමාණය 1 (පාලක - F1)	පොහොර ප්‍රමාණය 2	877	3.70	2.11 e	942	4.80	1.697 e
	ගොයම් පිදුරු (හෙක් වොන් 4) + F1	538	2.67	3.604 ab	625	2.00	2.940 bc
	හුණු (හෙක්/වොන් 7 + F1	560	2.00	3.503 ab	585	2.40	2.810 c
	දහයියා අඵ (හෙක්/වොන් 0.8) +1	370	1.65	3.103 cd	422	1.58	2.470 d
	දහයියා අඵ (හෙක්/වොන් 0.8) +1	640	2.56	2.826 cd	728	3.25	2.370 d
බී.ඩබ්. 267-3	පොහොර ප්‍රමාණය 1 (පාලක - F1)	579	1.83	2.825 cd	538	2.70	2.670 cd
	පොහොර ප්‍රමාණය 2	313	1.67	3.946 a	326	1.25	4.060 a
	ගොයම් පිදුරු (හෙක් වොන් 4) + F1	336	1.77	3.925 a	303	1.17	3.930 a
	හුණු (හෙක්/වොන් 7) + F1	288	1.22	3.331 bc	245	1.00	3.460 ab
	දහයියා අඵ (හෙක්/වොන් 0.8) F1	438	1.67	3.360 bc	378	1.25	3.140 bc
C.V %				13.3			14.0
ප්‍රභේදය				*			*
සමන				*			*

වත්තන් මල්වපල් රේන්ජ් පරීක්ෂාවට අනුව පොදු අක්ෂරයකින් දක්වන පිරිස් තීරයක ඇති අගයන් අතර සැලකිය යුතු වෙනසක් නැත.

පාලක පාත්ති වලින් අඩු අස්වැන්නක් ලැබීමට හේතුව අඩු ප්‍රමාණයන්ගෙන් P සහ K සැපයීම නිසා මූල්‍ය ලැබීම් ඔස්සිකරන ධාරිතාවය අඩුවී යන බව විෂවීම වැඩිවීම විය හැක (Tolldenier, 1977). Li Jin Pie (1984) විසින් ද යන බව විෂ සහිත පස්වලට ගොයම් පිදුරු සහ හුණු යෙදීමෙන් යන බව විෂ අඩුවී, ඒවායේ වගා කරන වී වල අස්වැන්න වැඩිවන බව වාර්තා කර ඇත. වී වගාකරන යන බව අධික නිමිත පස්වලට පොටෑසියම් යෙදීමෙන් අස්වැන්න වැඩිවන බව Singh සහ Singh (1987), Jayatilake, Bandara and Gunatilake (1984) නිරීක්ෂණය කර ඇත.

හෙක්ටයාරයකට හුණු වොන් 7 හෝ දහයයා අළු හෙක්ටයාරයකට වොන් 0.8 යෙදීමෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගත හැකි නමුත් පොහොර ප්‍රමාණය 2 හෝ පිදුරු යෙදීමෙන් ලැබෙන අස්වැන්න තරම් නැත.

හුණු ප්‍රතිකාරය මගින් පැලෑටියට අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ පෝෂක අවශ්‍යතා නොසැපයිය හැකි නමුත්, එය මගින් පස් පී.එච් අගය වැඩි කරන අතර පාංශු මාධ්‍යයේ හා පැලෑටි පටක වල ලෙරස් අයන ප්‍රමාණය අඩු කරයි. අධික ප්‍රමාණයන්ගෙන් P සහ K හෝ පිදුරු යෙදීමෙන් ලැබෙන අස්වැන්න තරම් අස්වැන්නක් හුණු යෙදීමෙන් නොලැබීමට හේතුවේ. මෙහි පෝෂක විය හැක (වගුව 2) යන බව විෂ සහිත පස්වල වගාකරන වී වල අස්වැන්න දහයයා අළු යෙදීමෙන් වැඩි වී ඇති අතර, මෙයින් පෙනීයනු ලබන්නේ යන බව විෂ සහිත පස් වල ධාන්‍ය අස්වැන්න වැඩි කිරීමට සිලිකා වල ඇති වැදගත්කමයි.

පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව, ධාරන ප්‍රභේදයක් (මරොක්කු දෙන) භාවිතයෙන් අස්වැන්න වැඩි කරගත හැකි බව පෙනීයනු ලැබේ.

කරයි. ප්‍රභේදය කුමක් වුවත් යන බව විෂ සහිත පස්වල හෙක්ටයාරයකට K_2O කිලෝග්‍රෑම් 103.5 හා හෙක්ටයාරයකට P_2O_5 කිලෝ ග්‍රෑම් 73.5 හෝ ගොයම් පිදුරු හෙක්ටයාරයකට වොන් 4.0 යෙදීමෙන් සැලකිය යුතු අස්වැන්න වැඩිවීමක් ලැබී ඇත. ධාරන වී ප්‍රභේදය භාවිතා කර වැඩි P හා K මට්ටම් හෝ පිදුරු යෙදීමෙන් වැඩිම අස්වැන්න වැඩිවීම ලබා දී ඇත. හුණු හෙක්ටයාරයකට වොන් 7 යෙදීම ප්‍රමාණයෙන් අධික වන අතර ආර්ථික වශයෙන් ලාභ දායක නොවේ. මේ හේතුව නිසා යන බව විෂ ඉවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රශස්ථ හුණු මට්ටම හඳුනා ගැනීමට තවදුරටත් අධ්‍යයනය කළ යුතුය.

නිගමනය

මෙම පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව ධාරන වී ප්‍රභේදය භාවිතා කිරීමෙන් පමණක් වී අස්වැන්න හෙක්ටයාරයකට වොන් 0.8 වැඩිවීමක් ලබාගත හැක. ඒ අතරම පහත රට තෙත් කලාපයේ යන බව විෂ සහිත බන්ජි පස්වල වැඩි ප්‍රමාණයන්ගෙන් P සහ K පොහොර එනම් හෙක්ටයාරයකට K_2O කිලෝ ග්‍රෑම් 103.5 හා හෙක්ටයාරයකට P_2O_5 කිලෝග්‍රෑම් 73.5, පිදුරු (හෙක්ටයාරයකට වොන් 4), හුණු (හෙක්ටයාරයකට වොන් 7.0) සහ දහයයා අළු (හෙක්ටයාරයකට වොන් 0.8) යෙදීමෙන් තවදුරටත් වී අස්වැන්න වැඩිකරයි. තෙස් වෙනත් අධික ප්‍රමාණයන්ගෙන් P සහ K පොහොර හෝ හෙක්ටයාරයකට ගොයම් පිදුරු වොන් 4 සමග නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණය යෙදීමෙන් හෙක්ටයාරයකට වොන් 1:1 සැලකිය යුතු අස්වැන්න වැඩිවීමක් ලබා ගත හැක. ධාරණ ප්‍රභේදයක් සමග අධික P සහ K පොහොර ප්‍රමාණයන් හෝ පිදුරු සම් මිශ්‍රණයක් වැඩිම අස්වැන්න ලබා දෙන ලදී.

අනුබද්ධය 1 - දුඹුරුවීම ලකුණු සඳහා සම්මත IRRI ක්‍රමය (1980)

ලකුණු	
1	සාමාන්‍ය වැඩීම හා පඳුරු දැමීම
2	සාමාන්‍ය වැඩීම පඳුරු දැමීමට ආසන්න නමුත් මේරු පත්‍රවල දුඹුරු පුළුඹි පෙන්වයි.
3	සාමාන්‍ය වැඩීම හා පඳුරු දැමීමට ආසන්න නමුත් සමහර මේරු පත්‍ර දම්පාට. සහ දොඩම් කහපාටය.
4. 5	වැඩීම හා පඳුරු දැමීම දුර්වලය, බොහෝ අවපාට වූ පත්‍ර ඇත.
6. 7	වැඩීම හා පඳුරු දැමීම නැවතී ඇත. බොහෝ පත්‍ර අවපාටව, මියගොස් ඇත.
9	පියලුම පත්‍ර මියයන හෝ මියගොස් ඇති අවස්ථාව.

REFERENCES

Bandara, W.M.J. and G.A. Gunathilake, (1994) Effect of applied. P & K on bronzing in rice grown in iron toxic mineral soils. J. Nat. Sci. Coun. Sri Lanka 22 (3): 219 - 230.

Benckiser, G. J.C.G. Ottow, S. Santiago, and I. Watanabe, (1982). Physico-chemical characterization of iron toxic soils in some Asian countries. IRRI Research paper series 85: 1- 5.

Gunathilake, G.A. (1989), Rice production in iron toxic soils of Sri Lanka. (Unpublished)

International Rice Research Institute (1980). Standard evaluation system for rice. 2nd Ed. International Rice Testing Program. Manila, Philippines, p.44.

Jayathilake Bandara, W.M. and G.A. Gunathilake, (1984). Effect of applied potassium on bronzing in rice. Krushi 6 (3): 29-33.

Jayawardana, S.D.G., T. Watanabe and K. Tanaka (1977). Relationship between oxidizing capacity and resistance to iron toxicity in rice Jap. Soc. Crop. Sci. Breed. 22: 35 -37.

- Li Gin-Pie (1984). Straw, Lime and Manganese dioxide amendments for iron toxic soils. *Int. rice. Res. Newsl.* 9 (5): 23.
- Ottow, G.C.G., G. Benckizer, I. Watanable and S. Santiago. (1983). Multiple nutritional soil stress as the prerequisite for iron toxicity of wetland rice (*Oryza sativa* L.). *Tropical Agriculture (Trinidad)* 60 (3): 102 - 106.
- Ota, Y. and N. Yamada (1962). Physiological study on bronzing in rice plant in Ceylon. *Proc. Crop. Sci. soc. Jpn.* 31: 89 - 97.
- PCARR, 1980. Standard methods of analysis for soil, plant tissue, water and fertilizer. Philippines council for Agricultural and Research Resource, Losbanos, Laguna, Philippines.
- Ponnamperuma, F.N. (1958). Lime as a remedy for physiological disease of rice associated with excess iron. *Int. rice. Commun. Newsl.* 7 (1) : 10 - 13.
- Singh, B.P. and S.N. Singh. (1987) Response of rice to K application in iron toxic valley soils. *Int. rice. Res. Newsl.* 12 (5): 31 - 32.
- Tanaka, A., R. Loe and S.A. Navasro (1966). Some mechanisms involved in the development of iron toxicity symptoms in the rice plant. *Soil. Sci. Plt. Nutri.* 14: 1 - 6.
- Trolldenier, G. (1977). Mineral nutrition and reduction process in the rhizosphere of rice. *Plant and soil.* 47: 193 - 202.
- Van Breeman and F.R. Moorman (1978). Iron toxic soils in soils and Rice. *Pro. Int. Symp. on soils and Rice, IRRI, Manila, Philippines.* p 781 - 800.